

***Rhizophagus (Rhizophagus) simplex* Reitter, 1884 ツヤネスイ**

体長 4mm ほどのやや大型の種。赤褐色～黒褐色で、口器、触角、肢、上翅基部、腹部は若干淡色。前胸背板はわずかに長さが幅より大きく、側縁はやや膨らむ。上翅は中央付近が最大幅で、小点刻の点刻列を装う。尾節板には微小な短毛がある。山地に見られ、少ない種である。

分布： 北海道，本州；サハリン，コーカサス，イギリス，フランス

撮影標本データ： 岐阜県高根村日和田，4. VII. 1994，吉富博之採集



***Rhizophagus (Rhizophagus) subvillosus* Reitter, 1884 ムクゲネスイ**

体長 3.5-4.0mm. 全体赤褐色を呈するが、頭胸背と上翅の中央や周辺部はやや暗色となる。体表面に毛があり、特に頭部と上翅末端、尾節板は顕著である。しかし、毛が少ない個体もあるので、注意。前胸背板は縦長で、両側は平行、やや小さい点刻を疎に装う。第5腹板は中央部が、急に深く横にえぐれている。熊本県の大矢山が基準産地で、朽木、落葉下などで得られるが、少ない。図鑑などに図示されていないが、酒井雅博(1993)が四国虫報に写真を掲載している。

分布： 本州，四国，九州

撮影標本データ： 神奈川県丹沢堂平，28. V. 1995，木下富夫採集

